

ドクターの茶飲み話

耳鳴り、難聴の症状をともなつためまいは、内耳の疾患を疑つて、まず耳鼻科へ。

笠井耳鼻咽喉科クリニック 院長 笠井 創先生 — 第2回




成人の患者さんの場合、耳の疾患で多いのは、めまい、耳鳴り、それに難聴が挙げられます。

めまいには、自分の体や周囲が突然ぐるぐる回りだす回転性のめまい、足元が頼りなくふわふわと浮いたように感じるもの、目の前が真っ暗になる立ちくらみなどの症状があります。

めまいの症状が現れる疾患もさまざまあるため、吐き気をともなつたりすると、何か深刻な病気なのではないか

と、心配される方も多いようですね。

そこで今回は、めまいについてお話ししてみたいと思います。



意識障害や

頭痛、手足のしびれ、舌のもつれ、目のかすみなどの症状をともなつていたら、脳梗塞、脳腫瘍など生命に関わる疾患を疑つてすぐに専門医の診断を受けたほうがよいでしょう。

多くのめまいの一因に見られるものです。大半のめまいは、吐き気をと

り、耳鼻科、脳神経科、神経内科などの症状がおきる原因は多岐にわたり、耳鼻科、脳神経科、神経内科など、それぞれの専門医による治療が必要となります。

ひとくちに「めまい」といっても、その症状がおきる原因は多岐にわたり、耳鼻科、脳神経科、神経内科など、それだけであれば、さほど心配

もなつような激しいめまいであつて、専門医に診てもうおづかになります。そのためには、十分な睡

眠や規則正しい生活、休養などをとり、ストレスの緩和に努めましょう。

耳鼻科の治療の対象となるのは、この内耳になんらかの直接的なダメージが加わって起ころうとすることがあります。外から触ることのできない、

内耳は、鼓膜の内側の中耳の奥にあり、堅い骨でがっちりと囲まれています。

また、軽いめまいであつても、立つていることが難しく、まっすぐ歩けなかつたり、物が二重に見えたりする場合は、脳血栓、脳出血、脳炎など、中枢障害が疑われます。

立ちくらみは起立性低血压によつて起り、後頭部から頸にかけての強い痛みや吐き気をともなえば緊張性頭痛がめまいの原因と考えられます。

地上の生き物は、すべて重力にあらがつて生命活動を行つています。

二足歩行の人間が一番楽に動ける体勢は、重心に対して垂直の状態であり、それは内耳の平衡感覚の働きによって維持されています。し

かも、この内耳の機能には、ある程度のゆとりがあり、必ずしも垂直でない状態や、行動中などに起きた少なづれを気にせずに、行動できるような仕組みになつていています。

しかし、ストレスなどで自律神経のバランスが崩れると、そのゆとりの幅が狭まり、普段は気にならない揺れなどをめまいと感じ取つてしま

うのです。

このようなめまいは、自律神経のバランスを正常に戻せば起きなくなります。そのためには、十分な睡

かさいはじむ・プロフィール
昭和58年、千葉大学医学部大学院終了、医学博士。国保君津中央病院(国立がんセンター)病院を経て、横須賀共済病院耳鼻咽喉科医長となり、千葉大学医学部非常勤講師を兼任。平成2年、横浜に耳鼻咽喉科管食道科笠井クリニックを開設。平成11年に笠井耳鼻咽喉科クリニック・自由が丘診療所を開設。

<http://www.linkclub.or.jp/~enkasai/>