

	製品名/一般名	販売(販売開始) <sup>*1</sup>	組成・剤形・容量 <sup>*2</sup>	色・におい・味	効能・効果	用法
ヒスタミンH <sub>1</sub> 受容体拮抗薬(第一世代)	クロダミン dl-マレイン酸 クロルフェニラミン	日医工 (2004) <sup>*5</sup>	(Syr) 0.05%	透明・芳香・甘味	蕁麻疹、血管運動性浮腫、枯草熱、皮膚疾患に伴う痒痒(湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症、薬疹)、アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	1日2~4回
	アリメジン 酒石酸アリメマジン	第一製薬 (1960)	(Syr) 0.05%	赤色・ストロベリー臭	皮膚疾患に伴う痒痒(湿疹、皮膚痒痒症、小児ストロフルス、中毒疹、咬刺症)、じん麻疹、感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽、アレルギー性鼻炎	1日3~4回
	ペリアクチン 塩酸シプロヘプタジン	万有 (1962)	(Syr) 0.04%	無色~微黄色透明・フルーツ臭 <sup>*7</sup> ・甘味 <sup>*7</sup>	皮膚疾患に伴う痒痒(湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症、薬疹)、じん麻疹、血管運動性浮腫、枯草熱、アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	1日1~3回
	タベジール フマル酸クレマスチン	ノバルティス (1975)	(Syr) 0.01%	無色・芳香・甘味及び苦味	アレルギー性皮膚疾患(蕁麻疹、湿疹、皮膚炎、痒痒症)、アレルギー性鼻炎、感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	1日2回
ヒスタミンH <sub>1</sub> 受容体拮抗薬(第二世代)	ザジテン フマル酸ケトチフェン	ノバルティス (1985)	(Syr) 0.02% ----- (DS) 0.1%	無色~微黄色透明・芳香・甘い ----- 白色・芳香・甘い(ストロベリー様) <sup>*7</sup>	気管支喘息、アレルギー性鼻炎、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚痒痒症	1日2回 朝食後及び就寝前
	セルテクト オキサトミド	協和発酵 (1987)	(DS) 2%	白色・無臭・甘味	気管支喘息、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、痒痒	1日2回 朝及び就寝前
	ゼスラン・ニボラジン メキタジン	旭化成ファーマ・ アルフレックスファーマ (1997)	(Syr) 0.03% (小児用細粒) 0.6%	(Syr) 無色~微黄色・芳香・甘い ----- (小児用細粒) 白色~微黄白色・芳香・甘い(フルーツ臭・イチゴ味) <sup>*7</sup>	気管支喘息 ----- アレルギー性鼻炎、じん麻疹、皮膚疾患に伴う痒痒(湿疹・皮膚炎、皮膚痒痒症)	1日2回 ----- 1日2回
	アレジオン 塩酸エピナスチン	日本ベーリンガー (2005)	(DS) 1%	うすいだいだい色・オレンジ様 <sup>*7</sup> ・甘い <sup>*7</sup>	アレルギー性鼻炎 ----- 蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒	1日1回 ----- 1日1回
メチルエーダー遊離抑制薬	リザベン トラニラスト	キッセイ (1982)	(細粒) 10% ----- (DS) 5%	淡黄色・においなし・わずかに甘い ----- 淡黄色・においなし・甘い	気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、ケロイド・肥厚性瘢痕	1日3回
	インタール クロモグリク酸ナトリウム	アステラス (1988)	(細粒) 10%	白色・においなし・甘い	食物アレルギーに基づくアトピー性皮膚炎	1日3~4回 毎食前ないし 毎食前及び就寝前
	ロメット レピリナスト	三菱ウェルファーマ (1990)	(細粒) 10%	白色~微黄白色・においなし・甘い	気管支喘息	1日2回 朝及び就寝前
	アレギサール・ ベミラストン ベミロラストカリウム	日研・ プリストル・マイヤーズ (1991)	(錠) 5、10mg ----- (DS) 0.5%	微黄白色(5mgのみ) ~黄白色・においなし・わずかに苦い ----- 白色~微黄白色・においなし・甘い	気管支喘息 ----- 気管支喘息 ----- アレルギー性鼻炎	1日2回 朝食後及び夕食後(又は就寝前) ----- 1日2回 朝食後及び就寝前 ----- 1日2回 朝食後及び就寝前
受容体拮抗薬 ロイコトリエン	オノン ブランルカスト水合物	小野 (2006) <sup>*6</sup>	(DS) 10%	白色~微黄色・においなし・甘い	気管支喘息	1日2回 朝食後及び夕食後
	シングレア・キプレス モンテルカストナトリウム	万有・杏林 (2001)	(チュアブル錠) 5mg	うすい赤色・チェリーのようなにおい <sup>*7</sup>	気管支喘息	1日1回 就寝前
Th <sub>2</sub> サイトカイン阻害薬	アイピーディ トシル酸スプラタスト	大鵬薬品 (2001)	(DS) 5%	白色・特異な芳香・いちご味 <sup>*7</sup>	気管支喘息	1日2回 朝食後及び夕食後
その他	グリチロン グリチルリチン酸モノアンモニウム <sup>*8</sup>	ミノファージェン (1991)	(錠) 35mg	白色・無臭 <sup>*7</sup> ・甘味 <sup>*7</sup>	慢性肝疾患における肝機能異常の改善、湿疹・皮膚炎、小児ストロフルス、円形脱毛症、口内炎	1日3回 食後