

■通年性アレルギー性鼻炎の治療

| 重症度 | 軽症 | 中等症 | | 重症 | |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病型 | | くしゃみ・鼻漏型 | 鼻閉型または 鼻閉を主とする充全型 | くしゃみ・鼻漏型 | 鼻閉型または 鼻閉を主とする充全型 |
| 治療 | ①第2世代 抗ヒスタミン薬 ②遊離抑制薬 ①、②のいずれか一つ | ①第2世代 抗ヒスタミン薬 ②遊離抑制薬 ③鼻噴霧用 ステロイド薬 ①、②、③のいずれか一つ 必要に応じて①または②に③を併用する | ①抗LTs薬 ②抗PGD ₂ ・TXA ₂ 薬 ③鼻噴霧用 ステロイド薬 | 鼻噴霧用 ステロイド薬 + 第2世代 抗ヒスタミン薬 | 鼻噴霧用 ステロイド薬 + 抗LTs薬または 抗PGD ₂ ・TXA ₂ 薬 必要に応じて点鼻用血管収縮薬を治療開始時の5~7日間に限つて用いる |
| | 鼻閉型で鼻腔形態異常を伴う症例では手術 特異的免疫療法 抗原除去・回避 | | | | |

症状が改善してもすぐには投薬を中止せず、数ヵ月の安定を確かめて、ステップダウンしていく。

注) 重症例で上記薬剤に反応しない例には経口ステロイド薬を短期間(1~2週間)使用しなければならないことがある。