Inter インタープレス

No.1483

監修:笠井耳鼻咽喉科クリニック 院長 笠井 創 先生

めまいの中で は最も多い

のめまいには様々な原因がある。

回転性めまい



浮動性めまい



平衡失調



もしかしたら… 耳の病気

- 内耳炎、中耳炎、外耳炎
- 突発性難聴
- メニエール病
- ・良性発作性頭位めまい症 など

もしかしたら…

脳や神経の病気

- 脳梗塞
- ・脳出血

など

もしかしたら・・・・

- ・薬による副作用
- ・耳の病気 など

人によって症状が異なる場合もありま す。めまいを感じたら病院で受診し、 原因をつきとめることが大切です。

自律神経の乱れもめまいを起こす



自律神経を崩し、メニエール 病や良性発作性頭位めまい症、 自律神経失調症などになり、 めまいを起こします。

めまいのほかに出る症状

主に耳の病気のめまいは、他にこんな症状 が出ることが多いので覚えておこう。

- 耳鳴り
- ・耳が聞こえない、 聞こえにくい
- 吐き気がする



まずは耳鼻科を受診し、耳に異常がない か検査が必要です

●こんなときはすぐ病院へ!

- ・激しい頭痛
- ・意識が乱れる、薄れる
- ・ろれつがまわらない
- 手足がしびれる
- ・ものが2重に見える



脳に異変が起きているかもしれません。急いで病院 へ行きましょう。

●平衡機能の訓練でめまいを予防●



頭を動かさず左右 の点を交互に見る



頭を前後に10回程 倒す



立ったり座ったり する



目を開き、または閉 じて片足で15秒立つ。

高校生で乱れやすい 自律神経が関わるめまいには

運動をして三半規管を鍛え たり、体のバランスを保つ 平衡機能を訓練することも めまいの予防になります。