

「眩晕」「低血压」「頭痛など」、
さまざまな疾患の症状として表れるま
い。中でも、激しいめまいとともに、耳
鳴り、難聴に襲われる「メニエール病」は、

**厚労省が指定の
厄介な特定疾患**

因は分かっていない。
発病は30～50歳代に多く男女差はない。きちよ
うめん、神経質な人に多く、地方より都市部、単
純労働より専門技術職に多いという調査結果もあ

30～50代
に要注意

の発作が継続する点。だが、診療室の笠井創院長は話す。
「個人差があるが、初回から2ヶ月まで数ヶ月、長い場合は3ヶ月の経過観察が必要です。

な場合もあります。気付けてほしいのは、めまい＝メニエール病といふ想い込み。的確な治療ためには、まず確定診をつけることが重要で

健康

厚生労働省が特定疾患(難病)として指定する厄介な病気だ。30～50歳代の働き人でストレスを嚙むとされる、

聴力と平衡機能をつかさどる内耳に余分なリンパ液がたまる、つまり内耳が水ぶくれの状態になることで起きる疾患である。

主な症状は、目の前がグルグルと回る回転性のめまいと、それに伴つて起こる耳鳴りと難聴。めまいは1～6時間程度続き、時には吐き気や嘔吐（おうと）を伴うこともある。

働き盛りの 年度替わり

重度の場合には、治療は、内耳の水ぶれを防ぐための利尿剤、炎症を抑えるステロイド剤といった薬剤の投与が主だが、重度の場合には手術が必要なこともあります。ただし、確実な診断につけるのは難しいといふ。が丘にある「アニエラ病」は元々が丘にあるため、最も発作だけの発作だけのため、最も確実な診断につけるのは難しいといふ。が丘にある「アニエラ病」は元々

には手術が必要
予防法としては、疲労、
睡眠不足などに注意し、
ストレスをためないよう
心がけること。
また、気圧の変化や天
候不順にも影響を受けやす

ストレスや疲れを
止めないように！

「がんが1年で最も多い傾向にある」(笠井医師)とい

う。
進入学や就職など新生
活がスタートすることこれか
らの時期だけに、ストレ
スや疲れをためないよう
注意したい。



立井創(かさい・はじめ)
1950年(昭25)三重県生まれ。
医学博士。77年千葉大学医学部卒
業。同大学耳鼻咽喉科学教室在籍。

多様な「めまい」

一口に「めまい」と言つても、その種類は非常に多様だ。

寝返りやおじぎの際などに感じる「頭位性めまい」をはじめ、ウイルス性で風邪の後などにかかる「前庭神経炎」、りやすい「急に立ち上がる」とて原因や症状もさまざまである。

めまいの中でも、「ミニエール病」が占める割合は非常に少なく、人口10万人に対して5~8人。

時に脳貧血の状態になれる「起立性低血圧」、のほか中耳炎の合併症、「緊張性頭痛」に伴つてしまいなど、

地域によつては25~38人
といつ報告もある。
しかし、ストレスが大
きく影響すること、原因

また先日、長嶋茂雄氏が発病した「脳梗塞(こうこうそく)」のように、中枢障害に由来するめまいもある。めまいに伴つて頭痛や手足のしびれ、舌のむづれなどがある場合には至急、病院を訪れるなければならぬ。これらはととしろう

状がなければ、たとえ
吐を伴うような激しい
まいでも、取りあえず
鼻咽喉科を受診しよ
う。

笠井 劇 (かさい はじむ)
1950年(昭25)三重県生まれ。
医学博士。77年千葉大学医学部卒業。同大学耳鼻咽喉科学教室など
を経て、83年国保君津中央病院耳
鼻咽喉科に勤務。その後国立がんセンター病院、
国家公務員等共済組合連合会・横須賀共済病院耳
鼻咽喉科医長などを歴任。90年笠井クリニック・横
浜)開設。99年笠井耳鼻咽喉科クリニック・自由
が丘診療室を開業し、現在に至る。